

Podmiot który uzyskał zezwolenie:

Nufarm GmbH&Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austri,

tel.: 0043 732 6918 2006, fax: 0043 732 6918 2004.

Producent: Nufarm S.A.S, 28 Boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, Republika Francuska, tel.: 0033 1 4085 5115, fax: 0033 1 4085 5060.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa,

tel.: (0-22) 620 32 52, fax: (0-22) 654 07 97.

Przeznaczony do stosowania zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

NANDO 500 SC


Zawartość substancji biologicznie czynnej:

fluazynam/N-(3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)-2-amino-3-chloro-4-

trifluorometylopirydyna (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-122/2009 z dnia 16.11.2009 r.

znaki ostrzegawcze:



Drażniący

Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

piktogramy:



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROSLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

- alternarioza

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

- zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek Nando 500 SC stosować przemiennie z innymi fungycydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

OKRES KARENCCI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZIEMNIAK - 7 DNI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupelnąć wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

? Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

? Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

? Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

? Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

? W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

? Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

? Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

? Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

? Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

? Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

? Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 682-04-04 Rzeszów - (0-17) 866-40-25

Kraków - (0-12) 411-99-99 Sosnowiec - (0-32) 266-11-45

Lublin - (0-81) 740-89-83 Tarnów - (0-14) 631-54-09

Łódź - (0-42) 657-99-00 Warszawa - (0-22) 619-66-54

Poznań - (0-61) 847-69-46 Wrocław - (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -